PROTOCOLO

USO DE EPIs PARA COLETA DE AMOSTRAS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES COORTE - UTI I e II

Os profissionais do laboratório responsáveis pela coleta de amostras de sangue deverão usar durante todo o tempo de permanência nos corredores das **UTIs I e II** coorte:

- Roupa privativa
- Máscara N95

Antes de entrar na área assistencial da UTI coorte, além dos EPIs acima, o profissional do laboratório deve utilizar:

- Protetor facial (Face Shield)
- Gorro
- Avental cirúrgico de pano
- Capa descartável sobre avental cirúrgico
- 01 par de luvas – entre um paciente e outro, retirar as luvas, higienizar as mãos e colocar novo par de luvas

Apenas o profissional do laboratório que ficar no corredor da UTI (profissional de apoio), sem ultrapassar a linha amarela, utilizará 02 pares de luvas sobrepostas, pois a segunda luva deverá ser utilizada para fazer uma "bolsa" com o tubo de coleta que for entregue pelo profissional que estiver dentro da UTI.

OBS: A entrada na sala assistencial da unidade deverá acontecer apenas por um profissional do laboratório enquanto o outro espera do lado de fora para receber as amostras coletadas. O profissional do corredor deverá usar apenas roupa privativa, N95 e luvas.

Sequência para colocar os EPIs:

1. Higienizar as mãos;
2. Vestir gorro;
3. Máscara N95*;
4. Protetor facial (Face Shield);
5. Avental cirúrgico de pano;
1. Avental descartável;
2. Calçar 02 pares de luvas sem talco;

Sequência para retirar dos EPIs (dentro da UTI I e II):

1. Retirar luvas;
2. Retirar avental descartável;
3. Higienizar as mãos;
4. Retirar avental cirúrgico de pano;
5. Higienizar as mãos;
6. Sair da unidade fechada
7. Higienizar as mãos.

Dentro da UTI coorte:

- Entrar na UTI coorte levando agulhas, seringas e tubos identificados.
- Não entrar com maletas na UTI coorte.
- Cada vez que coletar amostra de um paciente, levar os tubos para o profissional do laboratório que estiver no corredor aguardando. Atenção para não ultrapassar a linha amarela.
- Entre pacientes: retirar as luvas, higienizar as mãos com álcool gel e colocar novo par de luvas.

Ao final da Coleta na UTI I e II:

1. Retirar Face Shield em local apropriado (colocar no hamper);
2. Retirar gorro;
3. Higienizar as mãos em local apropriado com degermante, realizando degermação de mãos até altura dos cotovelos;
4. Manter o uso da máscara N95 enquanto estiver no corredor da UTI.

Observação 1: NÃO há necessidade de uso de propé. NÃO colocar máscara cirúrgica sobre a máscara N95.

Orientações a respeito do recebimento de amostras e funcionamento interno do laboratório:

1. As amostras deverão ser transportadas dos setores para o laboratório em recipiente exclusivo para esta finalidade.
2. O profissional do laboratório retira as amostras do recipiente em uso de luvas e coloca amostras na centrífuga.
3. Profissional retira as luvas com técnica adequada e higieniza as mãos, coloca um novo par de luvas após.
4. Higieniza **superfície externa da centrífuga** com álcool 70%.
5. Amostras são retiradas da centrífuga após, separadas por galerias e distribuídas por setores.
6. Após processamento de amostras, as bancadas e aparelhos devem ser limpos com maior frequência.