

No pronto atendimento os profissionais de saúde deverão usar gorro, máscara N95 (pois existe sala coletiva onde serão realizados procedimentos que geram aerossol com frequência) e óculos de proteção individual durante toda a permanência nas áreas de circulação de pacientes e atendimento.

→ Deverá higienizar as mãos e colocar avental e luva antes do atendimento de cada paciente, descartando o material logo após. **Não é necessário trocar óculos, gorro e máscara entre pacientes.**

→ Caso realize procedimentos com risco de respingos e geradores de aerossol utilizar protetor facial para evitar contaminação da máscara N95. **Cada máscara N95 terá validade de 07 dias**, devendo ser trocada antes do período caso perca a integridade (umidade, ausência de vedação, sujidade visível/contaminação com secreção). NÃO USAR MAQUIAGEM NEM PROTETOR SOLAR COM COR PELO RISCO DE DANIFICAR A MÁSCARA. Ao final do turno, retirar a máscara N95 pelos elásticos e **colocar em envelope/saco de papel**. NÃO colocar máscara cirúrgica sobre a máscara N95, como orienta Nota Técnica da ANVISA nº4/2020 atualizada em 21/03/2020.

→ Após cada atendimento em consultório do PA, deverá ser acionada equipe de higienização para limpeza do ambiente antes da entrada do próximo paciente.

Sequência para colocar os EPIs ao entrar no setor:

1. Higienizar as mãos;
2. Gorro;
3. Máscara N95¹;
4. Óculos ou protetor facial ²;

Manter uso de gorro, máscara N95 e óculos durante toda a permanência nas áreas de circulação de pacientes e atendimento. Sem necessidade de troca entre pacientes dos EPIs da cabeça. Retirar apenas ao sair do setor.

Antes de atender o paciente:

1. Higienizar as mãos;
2. Avental (gramatura 30 - 40)³;
3. Luvas;
4. Entrar no quarto/área do paciente;
5. **Higienizar as orelhas e o estetoscópio DO SETOR**

Sequência para retirar os EPIs:

1. Retirar luvas (com técnica adequada);
2. Higienizar as mãos (1ª vez);
3. Retirar avental (gramatura 30 - 40)³;
4. Higienizar as mãos (2ª vez);
5. Sair do quarto;
6. Higienizar as mãos (3ª vez).

Ao final do turno/saída das áreas de circulação dos pacientes:

1. Retirar óculos (próximo da pia) – lavar o óculos com água e sabão, secar, seguido de álcool 70%.
No caso de uso de protetor facial, retirá-lo pela parte traseira e encaminhá-lo ao CME.
2. Retirar Máscara pelas alças, sem tocar na parte interna e guardar em envelope de papel;
3. Retirar gorro;

com algodão embebido em álcool antes do uso. 4. Higienizar as mãos (4ª vez).

NÃO USAR ESTETOSCÓPIO PARTICULAR.

¹ Nos casos em que há indicação de máscara N95 no manejo de casos suspeitos de COVID19, a máscara terá validade de 07 dias, devendo ser trocada antes do período caso perca a integridade, apresente sinais de sujidade, umidade ou contato da máscara acidentalmente com o paciente ou objetos próximos a ele, descartá-la.

² O profissional responsável pelos **procedimentos de intubação orotraqueal, extubação, aspiração de vias aéreas, reanimação cardiopulmonar, nebulização e banho no leito**, ao invés dos óculos usará um **protetor facial** que deverá ser encaminhado IMEDIATAMENTE ao CME após o uso.

³ No procedimento de **banho no leito** de pacientes com suspeita de COVID-19, ou **situações que envolvam secreções volumosas** (vômitos, diarreia, sangramento, hipersecreção orotraqueal) após a colocação do avental descartável o profissional deverá colocar **capa plástica impermeável (transparente)**. Após o procedimento deverá retirar primeiro a capa impermeável e logo após o avental.

NÃO há necessidade de uso de propé. NÃO deve ser utilizado dois pares de luvas sobrepostas. NÃO colocar máscara cirúrgica sobre a máscara N95.